

JACEK SICIŃSKI¹ & GRZEGORZ TOŃCZYK¹

**Biological research of Grabia River
– fifty years of activity**

Abstract: Grabia, a small still close to natural conditions lowland river, has been an object of special interest for Łódź hydrobiologists for more than 50 years. Over 100 scientific papers and over 100 master theses were produced in the Faculty of Biology and Environmental Protection University of Łódź. The initiator was Prof. L. K. Pawłowski who spent many years conducting research into the river. The ground and the first research objective was to recognize the fauna diversity. The checklist encompass almost 1000 invertebrate and 24 fish species. Taxonomy, biology and ecology of various taxa have made for many decades an essential trend of scientific activity. Special attention was dedicated to rotifers, leeches, branchiobdellids, snails and bivalves, gammarids and copepods as well as aquatic insects, fish and also diatoms. Some aspects of zoobenthos and zooplankton communities ecology was the subject of 13 Ph. D. theses. The river with its rich animal and plant communities was also the subject of dynamics of river ecosystem research. The study on the structure of invertebrate assemblages on the background of habitat diversity has been recently conducted. The model may be treated as a reference to the restoration of European rivers and their valleys.

Key words: lowland river, ecology, central Poland, literature review.

1. Introduction

The Grabia River has been an object of special interest to Łódź hydrobiologists for more than fifty years. This small, typical rustic lowland river with an agricultural forested drainage basin is still close to natural conditions. This article is a synthetic presentation concerning the scientific results of biological research on the river. It also serves as an expanded and more detailed version, containing references to existing scientific literature, of the lecture presentation given in connection with the centenary

¹ Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology, University of Łódź, 12/16 Banacha, 90-237 Łódź, Poland, E-mail: sicinski@biol.uni.lodz.pl

anniversary celebration of the birth of Professor Leszek Kazimierz Pawłowski (PIECHOCKI 2002), who initiated and spent many years conducting research into the river. This anniversary celebration took place on December 19, 2002 in connection with the naming of a lecture hall in the Department of Biology and Environmental Protection in Professor Pawłowski's honor.

2. Study area

Grabia, a right bank tributary of the Widawka, is a river of 81 kilometers in length forming part of the Oder river basin (Fig. 1). The drainage area of the river covers 820 square kilometers. The river's water sources lie 229 meters above sea level and exude an average of 0,2 liters of water per second. The average depth of the river ranges from 0,5 meter in its upper stream to 0,8 meter in the lower, at times exceeding 2 meters in depth in its deepest parts. At the upper course the river bottom is sandy and sand-gravelly, changing to sandy and sandy-muddy in its middle course, with a muddy sandy bottom in the lower course. The width of the river valley ranges from 100 meters in the upper range to 1000–2000 meters in the lower. The Grabia empties into the Widawka at 143 meters above sea level, with an average slope of 1,06%. A description of the detailed physiographic characteristics of the Grabia River basin, including climatic conditions, sculpture of the earth's surface, the geology and the hydrography and flora profile can be found in the papers of PAWŁOWSKI (1958) and MAKSYMIOUK (1970). The waters of Grabia River are assessed as clean and its self-purification capacity is assessed as high (BABSKI et al. 1985). An excess of nutrients flowing into the river has been sometimes noted, especially in the upper course. Biological analyses of the fauna variation in the Grabia have been carried out for many years by employees of the University of Łódź and have demonstrated the high quality of its waters, which encourage the development of rich and diversified fauna and flora assemblages. This is confirmed by the high diversity of water insects inhabiting the river, in particular by stoneflies (Plecoptera) and mayflies (Ephemeroptera), which are considered to be among the best biological indicators of clean water.

The river valley in its middle and lower ranges is full of picturesque old riverbeds in various stages of succession. The bewitching aura of the river and river valley, the rich and variegated history of the area (DRONKA, ZIARNIK 1995), the many years of research conducted into its flora and fauna, and its value as an object of hydrobiological research all combined to spawn the idea of turning the river into a protected nature reserve




Fig. 1. The Grabia River and its location in Poland

(SICIŃSKI 1985). In the 1980' s documentation was prepared for a project to create a L. K. Pawłowski Natural Water Reserve on the Grabia River (JAŻDŻEWSKA et al. 1989). The aim of the project was to preserve the small river basin, together with its tributaries and surroundings, in a natural state. In addition to natural environmental protection the reserve was to serve scientific and didactical purposes. The project was never realized and today no one speaks anymore of the Grabia as a natural object worthy of protection. On the other hand it should be noted that the Grabia River valley is the object of lesser local protective regulation. A 6 kilometer stretch of its estuary lies in the Warta and Widawka Nature Reserve Park, and in its middle course the river flows through a protected nature reserve area. In addition in the middle basin area the Grabia River and river valley is part of a Natural Park Group. There are also two nature reserves in the Grabia basin: a forest reserve known as "Jodły Łaskie" and a peat reserve known as "Grabica."

The high natural value of the area is also demonstrated by the fact that the Grabia basin is the bed for a large number of invertebrates' species threatened with extinction. One may find them listed in Poland's so-called "red books" and "red lists," which contain a record of threatened and extinct species (GŁOWACIŃSKI 2002).

3. Diversity of fauna

One of the fundamental characteristics of the biota in the Grabia River valley is their high species richness and diversity. It is not surprising that this aspect was a focus of research into the area from its very inception.

Biological studies into some rotifers and leeches were conducted by Professor Pawłowski as early as 1928. In the 1930's he published a number of works on the intraspecific variation of *Haemopsis sanguisuga* and the parasitic rotifer *Drilophaga*, all based on collections of materials from the Grabia River (PAWŁOWSKI 1934, 1935, 1936). Intensive biological research into the river began in the early 1950's, and the decade produced a series of publications concerning the leeches (PAWŁOWSKI 1948, 1955; SANDNER 1951, 1952, 1954; WOJTAS 1959) as well as rotifers (PAWŁOWSKI 1954, 1956, 1958). This period marks the beginning of the many years of intensive research into the Grabia initiated and directed by Prof. Pawłowski. This research was continued by the Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology of the University of Łódź during the tenures of its subsequent directors: Prof. F. Wojtas, Prof. K. Jażdżewski and Prof. A. Piechocki. Over time the Grabia became an object of biological and ecological

research among various units of the Faculty of Biology and Earth Sciences of the University of Łódź.

Pawłowski's works on the rotifers of Grabia were continued in the 1960's and 1970's. A cyclic series of works ended in a publication in 1980 on the pleustonic rotifer assemblages. Earlier PAWŁOWSKI (1969) published a paper on the potamoplankton of Grabia River. This work, alongside with his other works on the rotifers, constitute examples of rarely conducted research into the micro-organism assemblages of the Grabia. Research into the annelids of the Grabia River is also continuing. Works by WOJTAS (1964) and KAHL and WOJTAS (1974) into the little known in Poland branchiobdellidans have been added to the earlier studies into leeches.

A rich and significant part of the scientific research into the Grabia has been carried out by hydroentomologists from the Łódź Zoological Centre. Their field studies into dragonflies, stoneflies and caddisflies commenced as early as the late 1940's and early 1950's. Their conclusions, however, were not drawn until the end of the 1950's and beginning of the 1960's (KLIMASZEWSKA 1959; WOJTAS 1961, 1962a, b; TOMASZEWSKI 1962). Throughout the whole period of biological research into the Grabia the hydroentomology has always had a significant role. Research into its water insects has continued without interruption throughout the entire second half of the 20th century, with only a certain decline in work in the 1970's when the staff of the Department of General Zoology led by Prof. F. Wojtas directed its attention to the Pilica River in connection with the Sulejowski reservoir created there. Among the rich harvest of hydroentomological works on the Grabia appearing in the 1960's and early 1970's one may find, in addition to the earlier mentioned works on the caddisflies and stone flies, the publication of JAŹDŹEWSKA (1967, 1971) on mayflies, KRAJEWSKI'S (1966, 1967, 1969) work on water bugs, and NIESIOŁOWSKI'S (1969) work on blackflies.

In addition to the work on entomofauna, research is carried out at the same time on other groups of invertebrates. BAZAN (1962) has written of the water mites of fish ponds supplied by the waters of the Grabia. A series of works on the mollusks of the Grabia have been published by PIECHOCKI (1966, 1969a, b, 1975). TABACKI (1971, 1977) has elaborated the copepods, while JAŹDŹEWSKI (1977) has published the first information on the amphipods of the Grabia River.

The works listed above on the fauna of the Grabia and the rich results they have yielded may be considered to be the first phase of the most intensified research, if one into account the intensity of field work, the volume of scientific work, and the wide spectrum of taxon's into which research was conducted. The basic composition of species and the distribution

of hydrofauna were then identified. So, the groundwork was laid for the implementation of further projects.

Publications concerning the invertebrates of the Grabia have appeared largely without interruption throughout the past half century. In the 1980's research into dragonflies was re-initiated and research into the mayflies was continued (JAŹDŹEWSKA 1997, 2001; TOŃCZYK 2001 – Ph D Th.). Particularly research into the non-biting midges, a group which play a key role in the benthos fresh water biota, was intensified. An expression of this trend in chironomid fauna research can be found in the series of works by GRZYBKOWSKA (1989, 1991, 1993 – Ass-Prof. Th.; GRZYBKOWSKA, WITCZAK 1990; GRZYBKOWSKA et al. 1990, 1996) concerning various aspects of the biology and ecology of Chironomidae. Research into this group of true flies is continuing. Non-biting midges and blackflies are not the only Diptera which have captured the attention of Łódź entomologists. WIEDEŃSKA (1987) has studied the crane flies (Limoniidae). The 1990's produced further interesting data and materials concerning the crustacean fauna inhabiting the underground waters of the Grabia River valley (KONOPACKA, SOBOCIŃSKA 1992).

Research into the fauna of the Grabia River has of course by no means ignored its fish. In a series of works into the ichthiofauna of the rivers of the Łódź Upland Region PENCZAK (1963 and 1969a, b, c) conducted a review of the species of the Grabia River as well as of their ecological characteristics. Research was conducted into other biological and ecological aspects of fish in the 1980's and 1990's (BAŃBURA et al. 1985; NOWAK, ZALEWSKI 1991). It should be noted, however, that the earliest information about the fish of the Grabia come from KULMATYCKI (1936). Other vertebrates of the Grabia region have not been the object of much scientific interest. KOEPPEN (1943) did note the appearance of the pond tortoise (*Emys orbicularis*) in the Grabia River valley. PAWŁOWSKI (1970a) listed the amphibians of the Grabia and the basins of the catchment area. MARKOWSKI (1981) provides information about the black stork appearing in the Grabia area.

Some groups of water invertebrates of the Grabia River have been the object of particular attention, especially because a group of assistants of Prof. Pawłowski's conducted research as a part of their doctor's theses. Such detailed studies are available concerning leeches (SANDNER 1950 – Ph D Th., WOJTAS 1960 – Ph D Th.), mayflies (JAŹDŹEWSKA 1968 – Ph D Th.), molluscs (PIECHOCKI 1968 – Ph D Th.), water bugs (KRAJEWSKI 1967 – Ph D Th.) and copepods (TABACKI 1969 – Ph D Th.). In addition biology and ecology of some invertebrate taxa were the subject of several doctoral theses carried out in the Faculty of Biology and Earth Sciences, such as NIESIOŁOWSKI'S (1978 – Ph D Th.) work on blackflies, TOŃCZYK'S

(2001 – Ph D Th.) study of dragonflies and WIEDEŃSKA'S (1983 – Ph D Th.) work on crane flies. Three doctor's theses concerning the structural groups of fish in the Grabia were written within the Department of Applied Ecology (FRANKIEWICZ 1989 – Ph D Th.; ŁAPIŃSKA 1996 – Ph D Th.; KRAUZE 2002 – Ph D Th.). Studies concerning diatoms assemblages from selected habitats of the Grabia River (SEKULSKA-NALEWAJKO 2001 Ph D Th.) and into the hydrographical characteristics of the Grabia basin (MAKSYMIOUK 1970) close the list of Ph. D. theses devoted to the area. It should be noted however that Prof. Pawłowski's own doctor's thesis in 1932 concerning the rotifer *Drilophaga delagei* was based on materials captured in the Grabia. Studies carried out in the 1980's into the non-biting midges of several lowland rivers of Central Poland, including among others the Grabia, formed the basis for GRZYBKOWSKA'S (1993 – Ass.-Prof. Th.) habilitation thesis.

Years of hydrobiological research into the Grabia River have produced a number of summations (PAWŁOWSKI 1970a; JAŹDŹEWSKA, JAŹDŹEWSKI 1985; TOŃCZYK 1995). One especially important related event among Łódź biologists was a conference organized in 1985 by the University of Łódź in cooperation with the Polish Fishermen's League devoted to the topic: "Protection and Management of Small Rivers" (ZALEWSKI 1985a). Included among the presentations given was a summary of the research of University of Łódź biologists, hydrologists, and chemists into the Grabia River.

The almost one thousand species that have been recorded in the Grabia and its catchment area confirm broad scope of research conducted here over several decades. It also shows the richness of the hydrofauna of this water region. The reason for this is due to the natural or very close to natural characteristics of the river and its valley, which is particularly true of the numerous and varied primary type habitats. Until now, 979 species of hydrofauna (Tab. 1) have been identified in the Grabia and a new species of stonefly – *Isoperla pawlowskii* Wojtas, 1961 was described (WOJTAS 1961). Water insects form the best known group: stoneflies, mayflies, dragon flies, water bugs and blackflies as well as: mollusks, leeches and rotifers. In each of the above mentioned taxon the number of recognized species constitutes more than a half of all those described for Poland. This, in turn, reflects the intensity and thoroughness of the studies conducted. In groups with many species of mountain origin (stoneflies and mayflies) this percentage is lower and ranges from 25–30%.

Some taxa of water invertebrates require, however, further research. This is true of meio- and microzoobenthos: gastrotrichs, nematods, harpacticoids and some other groups like water fleas, caddisflies, water beetles, non-biting midges and other true flies. Still little is known about oligochaetes.

Table 1: The species richness of animal higher taxa from Grabia River

No	Taxon	Number of species	Author
1	Protozoa	21	PAWŁOWSKI (1958)
2	Porifera	5	PAWŁOWSKI (1970a)
3	Trematoda	28	PAWŁOWSKI (1958)
4	Rotatoria	276	PAWŁOWSKI (1956, 1958, 1960, 1968a, 1969, 1970b, 1971, 1973)
5	Gastrotricha	4	PAWŁOWSKI (1958)
6	Branchiobdellae	5	WOJTAS (1964)
7	Oligochaeta	18	KAHL (unpb. data)
8	Hirudinea	14	WOJTAS (1959)
9	Gastropoda	29	PIECHOCKI (1969b)
10	Bivalvia	21	PIECHOCKI (1969b)
11	Copepoda	33	TABACKI (1971)
12	Cladocera	25	PAWŁOWSKI (1958, 1968a, 1969)
13	Malacostraca	5	JAŻDŻEWSKI & KONOPACKA (1995)
14	Hydracarina	17	BAZAN (1962), STRYJECKI (unpub. data)
15	Plecoptera	9	WOJTAS (1962)
16	Ephemeroptera	39	JAŻDŻEWSKA (1971, 1997, 2001)
17	Odonata	52	KLIMASZEWSKA (1959), TOŃCZYK (1998, 2001 – Ph D Th.)
18	Heteroptera	50	KRAJEWSKI (1969)
19	Trichoptera	65	TOMASZEWSKI (1962)
20	Megaloptera	2	PAWŁOWSKI (1970a), TOŃCZYK (unpub. data)
21	Planipennia	2	TOŃCZYK (unpubl. data)
22	Coleoptera	63	PAWŁOWSKI (1970a), TOŃCZYK (unpub. data)
23	Simuliidae	14	NIESIOŁOWSKI (1980b)
24	Chironomidae	132	GRZYBKOWSKA (1989, 1993 – Ass.-Prof. Th.), KLUKOWSKA (1998 & unpub. data)
25	Limoniidae	15	WIEDEŃSKA (1983 – Ph D Th., 1987)
26	Cyclostomata	2	PENCZAK (1969a), MARSZAŁ (2000)
27	Pisces	24	PENCZAK (1969a)
28	Amphibia	9	PAWŁOWSKI (1970a)

The deep knowledge concerning the diversity of hydrofauna provides a basis for an analysis of the anthropogenic long-term impact of the river environment. Comparative studies of some taxa examined in 1950s and at present (KLIMASZEWSKA 1959 *versus* TOŃCZYK 2001 – Ph D Th.) indicate that the Grabia did not undergo significant changes and its fauna are highly stable in terms of their composition and structure. On the other hand, analysis of the water-course regulation in the context of hydrofauna assemblage shows unfavorable local changes resulting from hydrotechnical interventions (TOŃCZYK 2001 – Ph D Th.).

4. Didactic activity

Another subject worth considering is the importance of the Grabia River as an educational component of studies carried out by the Institute of Ecology and Environmental Protection. Problems tackled in various master's theses reflect, to a certain extent, the research directions followed by the scientists from the Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology since its inception and later conducted also in other Departments (Tab. 2). Two thirds of the Grabia-related master theses were written in the Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology (earlier, until 1985 known as the Department of General Zoology). Faunistically-oriented works concerning various taxa of water invertebrates of the river and its catchment area water basins represent a substantial part of these. In the 1980's some master theses concerned fish. Works concerning the taxonomy and morphology of crustaceans, inter-species interactions including the works on comensal rotifers living on crustaceans and the role of snails as intermediary hosts of trematods are just a few examples of the subjects dealt with. The works on the structure of the Grabia macrozoobenthos initiated in 1960s in Prof. Pawłowski's Department represent a substantial portion of the topics chosen by the graduates of the Faculty. Other problems, such as invertebrate drift and migrations, settling in various habitats, seasonal changes and the impact of anthropogenic changes upon the structure and behavior of zoobenthos community, also still enjoy equal interest. They refer to both the macrofauna of soft bottom as well as to phytophilous invertebrate assemblages. The production of dominant species of chironomids, a description of the water slater (*Asellus aquaticus*) population in catchment area water basins, the analysis of fry, attempts to assess the dynamics of nutrients and organic matter in rivers, and finally the description of meadows in the Grabia valley are further examples of the variety of

Table 2: The specification of master theses produced in departments of Faculty of Biology and Environmental Protection University of Łódź in years 1947–2002

Departments	Number of masters thesis	Percent
Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology	71	66
Department of Applied Ecology	12	11
Department of Ecology and Vertebrate Zoology	6	6
Department of Experimental Zoology and Evolutionary Biology	16	15
Department of Botany	2	2
Total	107	100

subjects dealt with by the graduates of the Institute of Ecology and Environmental Protection. This variety has to be complemented with a wide range of experimental works on the biology of caddis flies and water mites based on the material collected in the Grabia and conducted for many years by the Department of Experimental Zoology and Evolutionary Biology.

5. Other trends of the research

During the first, pioneer stage of works, in the 1950s and 60s, most of the attention was paid to recognition of the biological diversity of the macroinvertebrates of the river. Well, the stage for carrying out deeper synecological studies was set. Although the problems were dominated by biodiversity studies, in addition to and together with the mainstream research there were also studies on the taxonomy of selected groups and species: rotifers, leeches, stoneflies, blackflies and gammarids (PAWŁOWSKI 1934, 1936, 1948; WOJTAS 1961; KITTEL 1974; JAŹDŹEWSKI 1977, NIESIOŁOWSKI 1987) as well as studies of water invertebrate biology: rotifers, leeches, water bugs, bivalves, snails and true flies (PAWŁOWSKI 1934, 1935, 1955; JAŹDŹEWSKA 1966; KRAJEWSKI 1966; PIECHOCKI 1969a, 1975; NIESIOŁOWSKI 1980b).

Ecological studies play an important role in the achievements of the teams working on the Grabia River. Elements of autecology and the biocenology of invertebrates and fish in particular have been present since the very beginning and constituted an important element of the monographic works on various taxa. A series of such works is listed in the opening paragraphs of this paper. In the 1990s there were numerous strictly ecological works by GRZYBKOWSKA (1989, 1991), GRZYBKOWSKA and WITCZAK (1990), GRZYBKOWSKA et al. 1990, 1996) on the production and distribution of chironomids, the analysis of fish community by ZALEWSKI et al. (1990) and informations on the orb shell cockles (Sphaeriidae) by PIECHOCKI and STRZELEC (1999) as well as the paper by JAŹDŹEWSKA (1997) on mayflies from sandy bottom of the Grabia River, the dominant habitat in the river bed.

The analysis of the distribution of selected taxa (WOJTAS 1959, 1962b; KRAJEWSKI 1969; PIECHOCKI 1969b; JAŹDŹEWSKA 1971; NIESIOŁOWSKI 1980b; TOŃCZYK 2001 – Ph D Th.) allows us to learn in detail about the distribution of fauna in the longitudinal profile of the river. The zonal distribution of animals in water-courses is best documented in mountain and sub-mountain rivers, where environmental factors are highly variable. Such data for lowland rivers are usually not precise and not always allow for identification of the characteristic parts of a river. Extensive studies on

the Grabia made it possible to analyze these phenomenon in a small lowland river. Studies on the distribution of water insects alongside the river course (Plecoptera, Ephemeroptera, Simuliidae, Heteroptera, Odonata) and representatives of other hydrofauna groups (Hirudinea, Mollusca) show that the Grabia can be divided into three faunistical zones. The spring and stream zone (upper 20–30 km of the river) is characterized by a small number of highly specific species, most of which are present only in the upper course of the river. In the middle zone (between 20–30 and 60–70 km of the river course) the species richness is the highest among the studied groups. The lower zone (60–70 km to the estuary at 81 km) is also rich with species, but large river forms are predominant there. This zone is clearly influenced by the fauna of the Widawka and Warta Rivers.

The Grabia with its rich flora and fauna has recently become an object of studies into various aspects of river ecosystem. Studies concerning the functioning of drainage basin of small rivers are conducted in the Department of Applied Ecology. One subject of interest is the assessment of the flow of nutrients to higher trophic levels, combined with comparative characteristics of fish communities in a lowland and upland river (ZALEWSKI et al. 1990). Studies by BIS et al. (1998b, 2000) and BIS and HIGLER (2001) focused on analysis of the Grabia macrozoobenthos groups and habitat diversity in the light of processes in the river catchment area. Finally, it is worth stressing that the Grabia has become one of 47 European rivers included in multi-scale comparative studies of the macroinvertebrate of European flowing water conducted for the purpose of biomonitoring. The Grabia, together with Italian River Dese, was a test field for biological and hydrological testing methods in the V 2.3/2.4 UNESCO Program "Ecohydrology" (BRAIONI et al. 1998).

Numerous data collected over the course of many years of hydrobiological research and the high degree of natural profile of the river and its valley gave an impulse to launch large scale biocenologic studies in the 1990s. They were conducted in the Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology of the University of Łódź in co-operation with Dutch hydrobiologists from the Institute of Forestry and Nature Research in Wageningen. Between 1992–1995 the Program „Hydraulics and macroinvertebrates: hydrology, sandbottom stability and lowland streams” was implemented with a view to identifying the structure and dynamics of fauna groups in sandy bottom. In 1998–2000 a Polish – Dutch Project “Ecological descriptions of natural water systems in Central Poland” was carried out. At that time the Grabia River was a convenient model for analyses and comparisons. Both projects were designed to identify the structure of invertebrate communities in the Grabia and their complexity in the background of habitat diversity (in particular considering the diversity of microhabitats of the river environment). The studies were supposed to

result in a model which would constitute a reference point for works on renaturalisation of european streams, rivers and their valleys.

Taking into account all the scientific achievements presented above and the natural values of the river and its valley, the authors of this paper envisage some areas for future studies that could supplement the picture of the river with missing elements of fauna, their synthetic presentation, and dynamic aspects of the river community. Main tasks should encompass:

1. Further inventory studies of less-known groups and further analysis of the diversity of already well-examined groups. Such studies would allow us to assess the level of changes of hydrofauna over time and their nature and source.

2. Autecological studies of the best known groups of animals, including dominant species of leeches, snails, bivalves, peracarid crustaceans, mayflies, dragonflies, stoneflies, blackflies and chironomids.

3. Biological studies of key species.

4. Further studies of assemblages of flora and fauna, their structure and behavior.

5. Studies focused on the impact of abiotic factors upon the nature and structure of benthic communities.

The Grabia, being an object of many years' biological studies, is a linking element for subsequent generations of biologists in Łódź. Investigations into the river have integrated various scientific teams and led to research co-operation between various laboratories and departments. Fashions and interest in environmental biology have changed over time, emphasis was put on various aspects of studies, but the Grabia has remained the object of a large spectrum of studies. There are new scientific projects, more or less relating to the river and its basin. It seems that environmental studies based on detailed works on the biological diversity of the ecosystem could form an interesting proposal for research teams of the Łódź center into the near and more distant future.

6. References

Original and refered papers:

- BABSKI, P., BREWIŃSKA-ZARAŚ, B., ZALEWSKI, M. 1985. *Hydrochemiczna charakterystyka Lubrzanki i Grabi*. [Hydrochemical characterization of Lubrzanka River and Grabia River]. [In:] M. Zalewski (ed.), *Ochrona i zagospodarowanie niewielkich rzek*. Uniw. Łódzki, Polski Związek Wędkarski, Łódź, Warszawa: 56-63.
- BAŃBURA, J., PRZYBYLSKI, M., ZALEWSKI, M. 1985. *Dynamika przestrzenna i sezonowa zespołów ryb w dorzeczach Grabi i Lubrzanki*. [Dynamics and seasonal changes of fish

- communities in drainage system of Grabia and Lubrzanka Rivers]. [In:] M. Zalewski (ed.), *Ochrona i zagospodarowanie niewielkich rzek*. Univ. Łódzki, Polski Związek Wędkarski, Łódź, Warszawa: 69–81.
- BAZAN, H. 1962. *Wodopójki (Hydracarina) Wyżyny Łódzkiej*. [Water mites (Hydracarina) of Łódź upland region]. *Fragm. Faun.*, 9: 255–273.
- BIS, B. 1997. *Zastosowanie technik analizy wieloczynnikowej w biomonitoringu wód śródlądowych*. [Multivariate statistics in freshwater biomonitoring studies]. Materiały konferencyjne: Spotkanie robocze członków Komitetu Naukowego PAN przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”, MAB-5/UNESCO, Univ. Łódzki, Łódź: 10–32.
- BIS, B. 1998a. *Freshwater biomonitoring standards in Poland. The case study – lowland rivers*. Proceedings of the First International Workshop „Use of biotic indices to evaluate the quality of freshwater streams”, EC-DG XII, CISBA, TECHWARE, Agricultural Institute of S. Michele a/Adige, Trento, Italy: 28–30.
- BIS, B. 1998b. *Biological and ecological species traits as a biomonitoring tool. The case study – Polish rivers*. Proceedings of the CNRS & CEMAGREF Workshop, Univ. Lyon, France: 6.
- BIS, B. 1998c. *Review of bioassessment of water quality: Structural and functional benthic metrics*. Documentation of the ALTERRA Seminar, Wageningen, the Netherlands: 2.
- BIS, B. 1999. *River habitat survey – physical and ecological assessment of lowland river systems: the Polish hydromorphological assessment methods*. Proceedings of the International Course & Workshop for the European representatives „River Habitat Survey”, Environment Agency, Scottish Natural Heritage, SEPA, Scotland: 29.
- BIS, B. 2001. *Importance of biomonitoring across river ecoregions for the development of sustainable water management (WFD)*. Proceedings of the 2nd Symposium for European Freshwater Sciences, Univ. Paul Sabatier, Toulouse, France: 16.
- BIS, B., FOKSOWICZ, M., ZALEWSKI, M. 2000. *Biologiczna ocena jakości wód: struktura i organizacja funkcjonalna fauny dennej wybranych fragmentów dorzecza Grabi i Pilicy*. [Biological assessment of freshwater quality: the structure and functional organization of macroinvertebrate assemblages]. Materiały konferencyjne „Kurs Ekohydrologii” – UNESCO/IHP, Łódź, Zakopane: 19.
- BIS, B., HIGLER, L. W. G. 2001. *Riparian vegetation of streams and the macroinvertebrate community structure*. *Ecohydrol. Hydrobiol.*, 1: 253–260.
- BIS, B., NOWAK, M., ZALEWSKI, M. 1995. *Invertebrate and fish community structure as an indicator of riverine ecosystem quality*. Proceedings of the International Symposium „Freshwater Quality: Defining the indefinable?”, Univ. Stirling, Scottish Natural Heritage, Scotland: 67.
- BIS, B., NOWAK, M., ZALEWSKI, M. 1996. *Hydraulics, organic matter and predators as factors regulating invertebrate distribution at the gradient from lowland to mountain streams*. Proceedings of the International Symposium „River Bottom IV”, Brno, Czech Republic: 32.
- BIS, B., ZDANOWICZ, A., ZALEWSKI, M. 1998a. *Catchment structure and nutrient dynamics of the lowland Grabia River*. Proceedings of the International Workshop on Ecohydrology UNESCO/UNEP, Łódź: 16.
- BIS, B., ZDANOWICZ, A., ZALEWSKI, M. 1998b. *Effects of catchment properties on physicochemistry, habitat heterogeneity and macroinvertebrate community of a lowland river*. Proceedings of the International Conference „Assessing the ecological integrity of running waters”, Vienna, Austria: 11.
- BIS, B., ZDANOWICZ, A., ZALEWSKI, M. 2000. *Effects of catchment properties on hydrochemistry, habitat complexity and invertebrate community structure in a lowland river*. *Hydrobiologia*, 422/423: 369–387.
- BIS, B., ZDANOWICZ, A., ZALEWSKI, M., MIODUSZEWSKI, W. 1996. *The relations between catchment use, hydrogeology and biodiversity in the lowland river system*. Proceedings of

- the International Symposium „Multiple land use and catchment management”, Univ. of Aberdeen, Scotland: 42.
- BOCIAN, J., BIS, B., ZALEWSKI, M. 2000. *The restoration of different degraded river systems*. Proceedings of the International Conference „River Restoration 2000”, Alterra, Wageningen, the Netherlands: 91.
- BOCIAN, J., BIS, B., ZALEWSKI, M. 2001. *The comparison of different degradation forms of rivers: Implications for water quality restoration*. [In:] H. I. Nuland, M. H. Cals (eds), *River Restoration in Europe*, RIZA, Wageningen: 137–143.
- BRAIONI, M. G., LENZI, M., ZALEWSKI, M., BIS, B. 1998. *Quantification of biological-ecological processes for planning and management of river restoration*. [In:] M. Zalewski, M. MacClain (eds), *Ecohydrology UNESCO*. A list of scientific Activities of IHP-V Projects 2.3/2.4: 10.
- BUCZYŃSKI, P., TOŃCZYK, G. 1997. *Analiza zgrupowań ważek (Odonata) wód bieżących Polski*. [Analysis of dragonflies (Odonata) assemblages of running waters in Poland]. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich, 8–11 września 1997 r., Poznań: 95.
- BURCHARD, J., MAKSYMUK, Z. 1985. *Przyrodnicze warunki kształtujące reżim hydrologiczny zlewni Grabi i Lubrzanki*. [Hydrological conditions of the catchments of Grabia and Lubrzanka Rivers]. [In:] M. Zalewski (ed.), *Ochrona i zagospodarowanie niewielkich rzek*. Uniwersytet Łódzki, Polski Związek Wędkarski, Łódź–Warszawa: 9–35.
- DRONKA, T., ZIARNIK, J. 1995. *W dolinie Grabi*. [In the valley of Grabia River]. Wyd. Oddz. PTTK w Łasku, Łask, 30 pp.
- FOKSOWICZ, M., BIS, B., ŻELAZNA-WIECZOREK, J., ZALEWSKI, M. 2001. *Ecological quality of running waters: structure and diversity of algae and macroinvertebrate assemblages in lowland rivers (Central Poland)*. Proceedings of the International 2nd Symposium for European Freshwater Sciences, Univ. Paul Sabatier, Toulouse, France: 55.
- FRANKIEWICZ, P. 1985. *Koza złotawa, Cobitis aurata (Fil.) w dorzeczu Odry*. [*Cobitis aurata* (Fil.) in the Odra River drainage-basin]. *Przeł. Zool.*, 29: 331–337.
- FRANKIEWICZ, P., ZALEWSKI, M. 1985. *Presja drapieżnictwa i konkurencja pokarmowa pomiędzy autochtonicznymi i introdukowanymi gatunkami ryb*. [Predation pressure and feeding competition between autochthonous and introduced fish species]. [In:] M. Zalewski (ed.), *Ochrona i zagospodarowanie niewielkich rzek*. Uniw. Łódzki, Polski Związek Wędkarski, Łódź, Warszawa: 82–94.
- GŁOWACIŃSKI, Z. 2002 (ed.), *Red List of Threatened Animals in Poland*. Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 155 pp.
- GRZYBKOWSKA, M. 1989. *Production estimates of the dominant taxa of Chironomidae (Diptera) in the modified, River Widawka and the natural, River Grabia, Central Poland*. *Hydrobiologia*, 179: 245–259.
- GRZYBKOWSKA, M. 1991. *Development and habitat selection of chironomid communities. Regulated Rivers: Reserch & Management*, 6: 257–264.
- GRZYBKOWSKA, M., WITCZAK, J. 1990. *Distribution and production of Chironomidae (Diptera) in the lower course of the Grabia River (Central Poland)*. *Freshwater Biol.*, 24: 519–531.
- GRZYBKOWSKA, M., PAKULSKA, D., JAKUBOWSKI, H. 1990. *Drift of coarse particulate organic matter (CPOM) in the lower course of two lowland rivers of Central Poland: Widawka and Grabia*. *Ekol. Pol.*, 38: 303–322.
- GRZYBKOWSKA, M., TEMECH, A., DUKOWSKA, M., 1996. *Chironomid production in four lowland rivers (Central Poland)*. *Pol. Arch. Hydrobiol.*, 43: 245–255.
- JAŻDŹEWSKA, T. 1966. *Nowe dane o rozrodzie pijawki rybiej *Piscicola geometra* (L.)*. [New data on the reproduction of the fish leech (*Piscicola geometra* (L.))]. *Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. 2, 21: 57–61.
- JAŻDŹEWSKA, T. 1967. *Nowe stanowisko jetki *Paraleptophlebia tumida* Bengtsson (Ephemeroptera, Leptophlebiidae)*. [New record of mayfly *Paraleptophlebia tumida* Bengtsson (Ephemeroptera, Leptophlebiidae)]. *Pol. Pismo Ent.*, 37: 479–485.

- JAŹDŹEWSKA, T. 1971. *Jętki (Ephemeroptera) rzeki Grabi*. [Mayflies (Ephemeroptera) of Grabia River]. *Pol. Pismo Ent.*, 41: 243–304.
- JAŹDŹEWSKA, T. 1995. *Jętki (Ephemeroptera) piaszczystego dna Grabi (dorzecze Warty)*. [Mayflies (Ephemeroptera) of the sandy bottom of the river Grabia, Warta drainage-basin]. Streszczenia referatów. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 14–16 września 1995 r., Łódź: 86.
- JAŹDŹEWSKA, T. 1997. *Mayflies (Ephemeroptera) of the sandy bottom of the river Grabia (Central Poland)*. [In:] P. Landolt, M. Sartori (eds), *Ephemeroptera & Plecoptera: Biology–Ecology–Systematics*. MLT, Fribourg: 157–166.
- JAŹDŹEWSKA, T. 2001. *Distribution in Poland of species of the Baetis group (Ephemeroptera, Baetidae)*. [In:] E. Dominguez (ed.), *Trends in Research in Ephemeroptera and Plecoptera*. Kulwer Academic/Plenum Publ.: 259–270.
- JAŹDŹEWSKA, T., JAŹDŹEWSKI, K. 1985. *Hydrobiologiczna charakterystyka Grabi*. [Hydrobiological description of Grabia River]. [In:] M. Zalewski (ed.), *Ochrona i zagospodarowanie niewielkich rzek*. Uniw. Łódzki, Polski Związek Wędkarski, Łódź, Warszawa: 36–48.
- JAŹDŹEWSKA, T., MAKSYMIOUK, Z., SICIŃSKI, J. 1989. *Projektowany rezerwat krajobrazowo-wodny na rzece Grabi im. prof. dr. Leszka Kazimierza Pawłowskiego*. [Prof. Leszek Kazimierz Pawłowski landscape-water reserve planned in the valley of Grabia River]. Urząd Miasta i Gminy w Łasku, Towarzystwo Przyjaciół Łasku: 16 pp.
- JAŹDŹEWSKI, K. 1977. *Remarks on the morphology of Gammarus fossarium Koch, 1835 and Gammarus kischineffensis Schellenberg, 1937*. *Crustaceana Supp.*, 4: 201–211.
- JAŹDŹEWSKI, K., KONOPACKA, A., 1995. *Pancerzowce – Malacostraca (prócz Oniscoidea)*. Katalog Fauny Polski, 13, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 165 pp.
- KAHL, K., WOJTAS, F. 1974. *Przegląd krajowych gatunków z rodzaju Branchiobdella*. [Branchiobdella species in Poland – the review]. *Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. 2, 56: 3–12.
- KITTEL, W. 1974. *Przyczynek do poznania larw Nemoura cinerea (Retzius, 1783) i Nemoura dubitans Morton (Plecoptera)*. [Contribution to the knowledge of Nemoura cinerea (Retzius, 1783) and Nemoura dubitans Morton larvae (Plecoptera)]. *Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. 2, 56: 17–20.
- KLIMASZEWSKA, H. 1959. *Larwy ważek (Odonata) rzeki Grabi*. [Dragonflies larvae (Odonata) in Grabia River]. *Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. 2, 5: 161–162.
- KLUKOWSKA, M. 1996. *Wpływ wybranych czynników abiotycznych na faunę ochotkowatych (Chironomidae, Diptera) w małej rzece nizinnej (rz. Grabia)*. [Influence of some abiotic factors on the chironomid fauna in a small lowland Grabia River]. III Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, 12–14 września 1996 r., Lidzbark Welski: 12.
- KLUKOWSKA, M., 1998. *Zgrupowania ochotkowatych (Chironomidae) zbiorników terasy zalewowej środkowego odcinka rzeki Grabi*. [Chironomid assemblages in some reservoirs of Grabia River flood-land]. V Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, 4–7 czerwca 1998 r., Bromierzyk: 16–17.
- KLUKOWSKA, M., 2002. *Siedliskowe zróżnicowanie struktury zgrupowań Chironomidae wybranych starorzeczy Pilicy, Rawki i Grabi*. [Chironomid assemblages on the background of habitat diversity in some old river beds of Pilica, Rawka and Grabia Rivers]. IX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, 16–18 maja 2002 r., Toruń, Bachotek: 15.
- KOEPFEN, E. 1943. *Verzeichnis der im Naturkunde-Museum zu Litzmannstadt gesammelten Aufgestellten und beobachteten Wirbeltiere des Litzmannstadter Raumes*. Litzmannstadt Oberbürgermeister der Stadt Litzmannstadt: 48 pp.
- KONOPACKA, A., SOBOCIŃSKA, V. 1992. *Uwagi na temat występowania skorupiaka Synurella ambulans (Müll.) (Amphipoda, Crangonyctidae) w Polsce*. [Remarks on the distribution

- of crustacean *Synurella ambulans* (Müll.) (Amphipoda, Crangonyctidae) in Poland]. *Przeg. Zool.*, 36: 123–131.
- KONOPACKA, A., PABICH, J. 1995. *Fauna wód podziemnych doliny rzeki Grabi*. [Groundwater fauna of the Grabia River valley]. Streszczenia referatów. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 14–16 września 1995 r., Łódź: 95.
- KONOPACKA, A., JAŹDZEWSKA, T. 1996. *Groundwater crustaceans of the wells in the Grabia River system (Central Poland)*. Proceedings of the 2nd European Crustacean Conference, Liege, Belgium, 2–6 września 1996 r.: 47.
- KORKUC, M., FRANKIEWICZ, P., ZALEWSKI, M. 1991. *The growth of dominant fish species in the Grabia River*. *Acta Univ. Lodz., Folia limnol.*, 5: 135–151.
- KOZŁOWSKA, J. 1962. *Wolnożyjące nicienie wodne Wyżyny Łódzkiej*. [Freeliving aquatic nematods of Łódź upland region]. *Fragm. Faun.*, 9: 281–305.
- KRAJEWSKI, S. 1966. *Biologia i rozwój pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis (Fabr.) w rzece Grabi*. [Biology and development of water bug *Aphelocheirus aestivalis* (Fabr.) in Grabia River]. *Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. 2, 21: 63–73.
- KRAJEWSKI, S. 1967. *Występowanie pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis (Fabr.) w rzece Grabi i rozmieszczenie w Polsce*. [Occurrence of water bug *Aphelocheirus aestivalis* (Fabr.) in Grabia River and the species distribution in Poland]. *Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. 2, 25: 83–94.
- KRAJEWSKI, S. 1969. *Pluskwiaki wodne (Heteroptera) rzeki Grabi i jej terenu zalewowego*. [Water bugs (Heteroptera) of Grabia River and its flood-land]. *Pol. Pismo Ent.*, 39: 465–513.
- KRAUZE, K., ZALEWSKI, M., 2000. *Czynniki warunkujące stabilność zespołów narybkowych małych rzek*. [Factors influencing the stability of fry assemblages in small rivers]. [In:] B. Czeczuga, J. I. Rybak (eds), *Szacunek dla wody*. Materiały Zjazdowe. XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Białystok: 132–133.
- KULMATYCKI, W. 1936. *Hydrografia i rybostan rzek województwa łódzkiego*. [Hydrography and ichtiofauna in rivers of Łódź voivodshaf]. *Czas. Przyr.*, 10: 123–150.
- LIGOWSKI, R. 1986. *Sessile algae in lower sections of the main tributaries of the Widawka River*. *Acta Univ. Lodz., Folia Bot.*, 4: 171–202.
- MAKSYMIAK, Z. 1970. *Hydrografia dorzecza Grabi*. [Hydrography of Grabia River drainage-basin]. *Acta Geogr. Lodz.*, 25: 1–102.
- MARKOWSKI, J. 1981. *Bocian czarny – Ciconia nigra (L.) na terenie Wyżyny Łódzkiej*. [Black stork – *Ciconia nigra* (L.) in the Łódź upland region]. *Acta Univ. Lodz., Folia zool. anthr.*, 1: 95–98.
- MARSZAŁ, L. 2000. *Rozmieszczenie minoga strumieniowego Lampetra planeri (Bloch) i minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae (Berg) w rzekach Polski Środkowej – stan aktualny i kierunki zmian*. [Distribution of european brook lamprey *Lampetra planeri* (Bloch) and ukrainian brook lamperty *Eudontomyzon mariae* (Berg) in the rivers of central Poland – the present state and the tendencies of changes]. [In:] T. Heese, A. Witkowski (eds), *Regionalna ochrona gatunkowa ryb, stan, zagrożenia, kierunki ochrony*. *Rocz. Nauk. Pol. Związku Wedkarskiego*, 14, Suppl.: 313–321.
- MOWSZOWICZ, J. 1978. *Conspectus florae Poloniae Medianae (plantae vasculares)*. *Przegląd flory Polski Środkowej (rośliny naczyniowe)*. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź, 395 pp.
- NIESIOŁOWSKI, S. 1968. *Hodowla larw i poczwerek meszek Simuliidae (Diptera, Nematocera) w laboratorium*. [Rearing larvae and pupae of blackflies Simuliidae (Diptera, Nematocera) in laboratory]. *Przeg. Zool.*, 12: 106–108.
- NIESIOŁOWSKI, S. 1969. *Nowe stanowiska meszki – Simulium ibariense Zivkovic et Grenier, 1895 (Diptera, Simuliidae) w okolicach Wielunia w Polsce*. [New record of blackfly – *Simulium ibariense* Zivkovic et Grenier, 1895 (Diptera, Simuliidae) in Wieluń vicinity (Poland)]. *Pol. Pismo Ent.*, 39: 381–384.

- NIESIOŁOWSKI, S. 1980a. *Studies on the abundance, biomass and vertical distribution of larvae and pupae of Black Flies (Simuliidae, Diptera) on plants of the Grabia river, Poland.* Hydrobiologia, 75: 149–156.
- NIESIOŁOWSKI, S. 1980b. *Meszki (Simuliidae, Diptera) rzek Widawki i Grabi.* [Blackflies (Simuliidae, Diptera) of Widawka and Grabia Rivers]. Pol. Pismo Ent., 30: 413–462.
- NIESIOŁOWSKI, S. 1987. *The variability and anomalies in black flies (Simuliidae, Diptera).* Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 2: 81–95.
- NOWAK, M., ZALEWSKI, M. 1991. *The fish distribution in habitats of lowland river Grabia.* Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 5: 152–165.
- OJRZYŃSKA, G., 1987. *Flora leśna okolic Kolumny pod Łaskiem.* [Woodland flora in the Kolumna vicinity near Łask]. Acta Univ. Lodz., Folia bot., 5: 51–77.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1934. *O wrotku pasożytniczym Drilophaga bucephalus Vejdovsky. Drilophaga bucephalus Vejdovsky, ein parasitisches Rädertier.* [Remarks on the parasite rotifer *Drilophaga bucephalus* Vejdovsky]. Mém. Acad. Pol. Cracovie, sér. B: 95–104.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1935. *Przyczynki do znajomości anatomii i biologii Drilophaga delagei de Beauchamp.* [Contribution to the knowledge of anatomy and biology of *Drilophaga delagei* de Beauchamp]. Arch. Hydrobiol. i Ryb., 9: 1–30.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1936. *O tak zwanych odmianach pijawki Haemopsis sanguisuga (Linn.). Über die sogenannten varietäten des Egels Haemopsis sanguisuga (Linn.).* [Remarks on varieties of the leech *Haemopsis sanguisuga* (Linn.)]. Ann. Mus. Zool. Pol., 11: 161–169.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1938. *Materialen zur Kenntnis der mossbewohnten Rotatorien Polens I.* Ann. Mus. Zool. Pol., 13: 115–159.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1948. *Przyczynek do systematyki pijawek z rodzaju Erpobdella de Blainville.* Contribution à la systématique des sangsues du genre *Erpobdella* de Blainville. Pr. Wydz. Mat.-Przyr. Łódz. TN, 8: 1–54.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1954. *Nowe wrotki (Rotatoria) w faunie Polski.* [New rotifers (Rotatoria) in the fauna of Poland]. Kosmos, 3: 336–337.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1955. *Observations biologiques sur les sangsues.* Bull. Soc. Sci. Łódź, 6, 5: 1–21.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1956. *Première liste des Rotifères trouvés dans la rivière Grabia.* Bull. Soc. Sci. Łódź, 7, 4: 1–54.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1958. *Wrotki (Rotatoria) rzeki Grabi. Część I – Faunistyczna.* [Rotifers of Grabia River. Part I – Faunistic]. Pr. Wydz. Mat.-Przyr. Łódz. TN, 50: 439 pp.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1960. *Rotifères nouveaux et rares parmi la faune de la Pologne.* Bull. Soc. Sci. Łódź, 11, 6: 1–15.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1968a. *Nouvelles observations sur les Rotifères de la rivière Grabia.* Pr. Wydziału Mat.-Przyr. Łódz. TN, 103: 1–48.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1968b. *Pijawki Hirudinea.* Katalog Fauny Polski, 11, 3, PWN, Warszawa, 94 pp.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1969. *Syrton rzeki Grabi.* [Potamoplankton of the Grabia River]. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego, ser. 2, 33: 3–16.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1970a. *Materiały do makrofauny rzeki Grabi.* [Remarks on macrofauna of Grabia River]. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego, ser. 2, 40: 3–17.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1970b. *Les Rotifères de la rivière Grabia. Variations observées au cours d'un cycle de vingt-quatre heures dans la composition de la faune des Rotifères.* Pr. Wydz. Mat.-Przyr. Łódz. TN, 110: 5–127.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1971. *Liste supplémentaire des Rotifères trouvés dans la rivière Grabia.* Bull. Soc. Sci. Łódź, 21: 1–10.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1973. *Les Rotifères de la rivière Grabia dans le profile longitudinal.* Pr. Wydz. Mat.-Przyr. Łódz. TN, 116: 1–43.

- PAWŁOWSKI, L. K. 1980. *Wrotki (Rotatoria) w pleustonie zespołu Wolffietum arrhizae Mijaw. et J. Tx., 1960.* [Rotifers (Rotatoria) in the pleuston of *Wolffietum arrhizae* Mijaw. et J. Tx., 1960 community]. *Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. 2, 33: 7–103.
- PENCZAK, T. 1963. *A report on the crosses Gasterosteus aculeatus L. with various number of dorsal spines.* *Naturwissenschaften*, 2: 49.
- PENCZAK, T. 1967. *Jelec Leuciscus leuciscus (L.) z Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Część I. Materiały do znajomości biologii jelca.* [Dace *Leuciscus leuciscus* (L.) in Łódź upland region and adjacent areas. Part I. Contribution to the biology of dace]. *Acta Hydrobiol.*, 9: 281–300.
- PENCZAK, T. 1968. *Jelec Leuciscus leuciscus (L.) z Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Część II. Materiały do znajomości morfologii jelca.* [Dace *Leuciscus leuciscus* (L.) in Łódź upland region and adjacent areas. Part II. Contribution to the morphology of dace]. *Acta Hydrobiol.*, 10: 137–153.
- PENCZAK, T. 1969a. *Ichtyofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Część Ic. Hydrofauna i rybostan Warty i dopływów.* [The ichthyofauna of the rivers of the Łódź Upland and adjacent areas. Part Ic. The hydrography and fishes of the Warta basin]. *Acta Hydrobiol.*, 11: 69–118.
- PENCZAK, T. 1969b. *Ichtyofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Część II. Ekologia.* [The ichthyofauna of the rivers of the Łódź Upland and adjacent areas. Part II. Ecology]. *Acta Hydrobiol.*, 11: 313–338.
- PENCZAK, T. 1969c. *Ichtyofauna rzek Wyżyny Łódzkiej i terenów przyległych. Część III. Przegląd i charakterystyka gatunków.* [The ichthyofauna of the rivers of the Łódź Upland and adjacent areas. Part III. Review and description of species]. *Acta Hydrobiol.*, 11: 339–360.
- PENCZAK, T., JAKUBOWSKI, H. 1990. *Drawbacks of electric fishing in rivers.* [In:] I. G. Cowx (ed.), *Developments in Electric Fishing.* Fishing News Books, Oxford, IX + 358 pp.
- PIECHOCKI, A. 1966. *Występowanie Lymnaea truncatula (Müll.) w rzece Grabi.* [Occurrence of *Lymnaea truncatula* (Müll.) in Grabia River]. *Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego*, ser. 2, 21: 75–83.
- PIECHOCKI, A. 1969a. *Obserwacje biologiczne nad małżami z rodziny Unionidae w rzece Grabi.* [Biological observations on bivalves from family Unionidae in Grabia River]. *Acta Hydrobiol.*, 11: 57–67.
- PIECHOCKI, A. 1969b. *Mięczaki (Mollusca) rzeki Grabi i jej terenu zalewowego* [Molluscs of Grabia River and its flood-land]. *Fragm. Faun.*, 15: 111–197.
- PIECHOCKI, A. 1971. *Próba wykorzystania domków chruścika – Linnephilus flavicornis (Fabricius) – w badaniach nad malakofauną drobnych zbiorników wodnych.* [Use of caddis fly *Linnephilus flavicornis* (Fabricius) larval tubes in the research of the malacofauna in small water basins]. *Acta Hydrobiol.*, 13: 77–85.
- PIECHOCKI, A. 1975. *Beobachtungen über den Bau von Laichen und die Fortpflanzung von Süßwasserschnecken aus den Familien: Physidae, Lymnaeidae und Planorbidae.* *Fragm. Faun.*, 20: 223–232.
- PIECHOCKI, A. 2002. *Profesor Leszek Kazimierz Pawłowski (1.10.1902 – 16.08.1980)* [Professor Leszek Kazimierz Pawłowski (1.10.1902 – 16.08.1980)]. *Sylwetki Łódzkich Uczonych*, 66, Łódzkie Towarzystwo Naukowe: 7–34.
- PIECHOCKI, A., STRZELEC, M. 1999. *Ecology of Sphaeriidae (Bivalvia: Heterodonta) in sandy bottom sections of the Grabia River (C-Poland).*, *Malac. Rev.*, Suppl. 8, Freshwater Mollusca I: 37–58.
- PUCHALSKI, W., BIS, B., FRANKIEWICZ, P., ZALEWSKI, M. 1991. *Improving the recovery of biota in perturbed streams of the contrasting trophy.* *Proceedings of the First International Workshop „Lowland Stream Restoration”, Lund, Sweden: 23.*

- PUCHALSKI W., BIS, B., ZALEWSKI, M. 1995. *Procesy retencji nutrientów w ekotonach rzek zasilających zbiorniki zaporowe*. [Nutrients retention in river ecotone zones]. [In:] M. Zalewski, ed., *Procesy biologiczne w ochronie i rekultywacji nizinnych zbiorników zaporowych*, Bibl. Monitoringu Środowiskowego, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Łódź: 155–177.
- PUCHALSKI, W. BIS, B., ZALEWSKI, M. 1996. *Procesy retencji nutrientów w ekotonach rzek zasilających zbiorniki zaporowe* [Nutrients retention in river ecotone zones]. Spotkanie robocze członków Komitetu Naukowego PAN, Prezydium PAN, „Człowiek i Środowisko”, MAB-5/UNESCO, Uniw. Łódzki, Łódź: 14.
- SANDNER, H. 1951. *Badania nad fauną pijawek*. [Research on the fauna of leeches]. Acta Zool. Oecol. Univ. Lodz., 4, 50 pp.
- SANDNER, H. 1952. *Badania nad fauną pijawek* [Research on the fauna of leeches]. Spraw. Łódz. TN, 6, 1: 52–54.
- SANDNER, H. 1954. *Recherches sur la faune des sangsues*. Bull. Soc. Sc. Łódź, 5, 3: 1–16.
- SEKULSKA-NALEWAJKO, J., LIGOWSKI, R. 2000. *Benthic assemblages as the main source of drifting diatoms in the seston of a lowland river (Grabia River, central Poland)*. 16th International Diatom Symposium, Athens, Aegean Islands, Greece, Abstracts: 131.
- SICIŃSKI, J. T. 1976. *Flora segetalna Kotliny Szczercowskiej (Widawskiej)* [Segetal flora in the Szczerców valley]. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego, ser. 2, 8: 31–61.
- SICIŃSKI, J. T. 1985. *Projektowany rezerwat krajobrazowo-wodny na rzece Grabi*. [Landscape-aquatic reserve planned in the valley of Grabia River]. [In:] M. Zalewski (ed.), *Ochrona i zagospodarowanie niewielkich rzek*. Uniw. Łódzki, Polski Związek Wędkarski, Łódź, Warszawa: 64–68.
- SMENDOR, B. 1959. *Wrotki z rodzaju Keratella B. de St.Vinc. ze zbiorników terenu zalewowego rzeki Grabi*. [Rotifers from genus *Keratella B. de St.Vinc.* in Grabia River flood-plain reservoirs]. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego, ser. 2, 6: 57–67.
- TABACKI, A. S. 1971. *Widłonogi (Copepoda) rzeki Grabi (część faunistyczna)* [Copepods of Grabia River (faunistic part)]. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Łódzkiego, ser. 2, 44: 31–52.
- TABACKI, A. S. 1977. *Positiver Einfluss der Wasserpflanzen auf die Entwicklung der Ruderfusskrebse im Potamoplankton*. [In:] R. Tüxen (ed.), *Vegetation und Faune*. Ber. Int. Symp. Int. Verein. Vegetationskunde, J. Cramer Ltd., Vaduz: 165–170.
- TOMASZEWSKI, C. 1962. *Chruściki (Trichoptera) Wyżyny Łódzkiej*. [Caddis flies (Trichoptera) of Łódź upland region]. *Fragm. Faun.*, 9: 331–353.
- TOŃCZYK, G. 1995a. *50 lat badań zwierząt bezkręgowych rzeki Grabi*. [50 years of Grabia River invertebrates research]. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 14–16 września 1995 r., Łódź. Streszczenia Referatów: 166.
- TOŃCZYK, G. 1995b. *Pasożyty zewnętrzne i formy epibiontyczne ważek (Odonata)*. [Ectoparasites and epibionts of dragonflies (Odonata)]. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 14–16 września 1995 r., Łódź. Streszczenia Referatów: 165.
- TOŃCZYK, G. 1998. *Występowanie rzadkich gatunków ważek (Odonata) w Polsce Środkowej*. [Occurrence of some rare dragonflies (Odonata) species in central Poland]. I Krajowe Seminarium Odonatologiczne, 17–19 kwietnia 1998 r., Bromierzyk: 14–17.
- TOŃCZYK, G. 2001. *Analiza składu pokarmu larw ważek (Odonata) jako element badań ekosystemów wodnych*. [Dragonflies larvae stomach content analysis as an aspect of aquatic ecosystem research]. VIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, 9–12 czerwca 2001 r., Warszawa–Mikołajki: 40–42.
- TOŃCZYK, G. 2002. *Zmiany składu gatunkowego zgrupowań larw ważek w dolinie środkowego biegu Grabi (Polska Środkowa) analiza 50-letnich danych*. [Changes of species composition of dragonflies larvae assemblages in the middle course of Grabia River (central Poland)]

- 50 years data analysis]. IX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, 16–18 maja 2002 r., Toruń–Bachotek: 30.
- TOŃCZYK, G., BEDNAREK R., WASIAK P. 1997. *Analiza zgrupowań makrofauny zasiedlającej grąźel żółty (Nuphar luteum (L.) Sm.) w wodach płynących (rzeka Grabia, stanowisko Zimne Wody)*. [Analysis of macrofauna assemblages connected with *Nuphar luteum* (L.) Sm. in running waters (Grabia River in Zimne Wody)]. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich, 8–11 września 1997 r., Poznań: 211–212.
- TOŃCZYK, G., KLUKOWSKA, M. 1997. *Wpływ czynników hydrologicznych na bentofaunę zasiedlającą rzeki nizinne*. [Some hydrological factors effect on the benthic fauna of lowland rivers]. IV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, 5–7 czerwca 1997 r., Siedlce: 19–20.
- VEPSÄLÄINEN, K., KRAJEWSKI, S. 1974. *The life cycle and alary dimorphism of Gerris lacustris (L.) (Heteroptera, Gerridae) in Poland*. Notulae Ent., 54: 85–89.
- WIEDEŃSKA, J. 1987. *Morphologie der Larven und Puppen einiger Phylidorea-Arten (Diptera, Limoniidae)*. Tijdsch. Ent., 130: 33–47.
- WIEDEŃSKA, J., ŁACHETA, A. 1999. *Fauna Limoniidae i Pediciidae doliny rzeki Grabi*. [Crane flies (Limoniidae and Pediciidae) of the Grabia River valley]. XVIII Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE, 14–16 maja 1999 r., Spała, Dipteron, 15: 36–37.
- WOJTAS, F. 1959. *Pijawki (Hirudinea) rzeki Grabi*. [Leeches (Hirudinea) of Grabia River]. Pr. Wydz. Mat.-Przy. Łódz. TN, 58: 1–60.
- WOJTAS, F. 1961. *Description d'une nouvelle plécoptère (Isoperla pawlowskii n. sp.)*. Bull. Soc. Sc. Łódź, 12: 1–8.
- WOJTAS, F. 1962a. *Beschreibung der bisher unbekanntenen Plecopterenlarve von Nemoura dubitans Morton, 1894 (Plecoptera)*. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 35: 285–287.
- WOJTAS, F. 1962b. *Widelnice (Plecoptera) rzeki Grabi*. [Stoneflies (Plecoptera) of Grabia River]. Pr. Wydz. Mat.-Przy. Łódz. TN, 77: 1–62.
- WOJTAS, F. 1964. *Materiały do poznania skąposzczetów Branchiobdellidae rzeki Grabi*. [Contribution to the knowledge of Branchiobdellidae in Grabia River]. Przegl. zool., 8: 149–152.
- ZALEWSKI, M. (ed.) 1985a. *Ochrona i zagospodarowanie niewielkich rzek*. [Conservation and fishery management of small river systems]. Uniw. Łódzki, Polski Związek Wędkarski, Łódź, Warszawa, 111 pp.
- ZALEWSKI, M. 1985b. *Czynniki warunkujące sukces introdukcji w niewielkich rzekach*. [Factors limiting fish stocking success in small rivers]. [In:] M. Zalewski (ed.), *Ochrona i zagospodarowanie niewielkich rzek*. Uniw. Łódzki, Polski Związek Wędkarski, Łódź, Warszawa: 95–111.
- ZALEWSKI, M. 1994. *Rola ekotonowych stref buforowych w redukcji zanieczyszczeń obszarowych i przyspieszania tempa samooczyszczania rzek*. [Significance of ecotone buffer zones for the river pollution decrease and for the rate of the self-purification]. [In:] M. Zalewski (ed.), *Zintegrowana strategia ochrony i zagospodarowania ekosystemów wodnych*. Woj. Inspektorat Ochrony Środowiska, Uniw. Łódzki, Bibl. Monitoringu Środowiska, Łódź: 25–33.
- ZALEWSKI, M., AMIROWICZ, A., BIS, B., BŁACHUTA, J., BREWIŃSKA, B., FLEJTUCH, T., FRANKIEWICZ, P., JAŻDŹEWSKA, T., JAŻDŹEWSKI, K., MAZURKIEWICZ, G., NIESIOŁOWSKI, S., NOWAK, M., PRZYBYLSKI, M., PUCHALSKI, W., STARMACH, J., WIŃKOWSKI, A. 1990. *Struktura i funkcjonowanie ekosystemów małych rzek*. [Structure and dynamics of small river ecosystems]. [In:] Z. Kajak (ed.), *Funkcjonowanie ekosystemów wodnych ich ochrona i rekultywacja. Część I. Ekologia zbiorników zaporowych i rzek*. Wyd. SGGW-AR, Warszawa: 282–320.
- ZALEWSKI, M., FRANKIEWICZ, P., PRZYBYLSKI, M., BAŃBURA, J., NOWAK, M. 1990. *Structure and dynamics of fish communities in temperate rivers in relation to the abiotic – biotic regulatory continuum concept*. Pol. Arch. Hydrobiol., 37: 151–176.

- ZDANOWICZ, A. 2002. *Analiza przemieszczania się azotu z obszaru doliny do rzeki z uwzględnieniem wpływu stref ekotonowych na jakość wód gruntowych zasilających rzekę*. [Analysis of nitrogen translocation in the river valley and the ecotone zones effect on the groundwater quality]. [In:] W. Puchalski, J. K. Pawelczuk (eds), *Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych*, 26–28.09.2002 r., Sarbinowo: 61–63.
- ZDANOWICZ, A., BIS, B., ZALEWSKI, M., MIODUSZEWSKI, W. 1998. *Wpływ użytkowania i zagospodarowania nizinnej zlewni rzecznej na ocenę stabilności i różnorodności ekosystemu*. [Catchment use effect of the lowland river system on the ecosystem stability and diversity]. Konferencja naukowo-techniczna: „Bliskie naturze kształtowanie rzek i potoków”, Zakopane, 5–7 października 1998 r., Politechnika Krakowska, IMGW, Kraków: 19–30.

Master's theses:

Theses were produced in the Faculty of Biology and Environmental Protection (formerly Faculty of Mathematics and Natural History transformed later into the Faculty of Biology and Earth Sciences). Abbreviations: DIZH – Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology; DAE – Department of Applied Ecology; DEVZ – Department of Ecology and Vertebrate Zoology; DEZEB – Department of Experimental Zoology and Evolutionary Biology; DB – Department of Botany.

- BANASIAK, A. 1959. *Łąki na prawym brzegu Grabii na odcinku Grabno – Marzenin*. [The meadows of Grabia River valley between Grabno and Marzenin]. (DB).
- BAZAN, J. 1998. *Ocena zdolności retencji i translokacji fosforu w tkankach roślin wodnych i przybrzeżnych w dorzeczu Grabii*. [Phosphorus retention and translocation capacity at plant tissues in Grabia River catchment area]. (DAE).
- BEDNAREK, R. 1997. *Makrofauna narośliwna rzeki Grabii. 2. Bezkręgowce zasiedlające dno w obrębie kęp grążela żółtego (*Nuphar luteum* (L.) Sm.)*. [Epiphytic macrofauna in Grabia River. 2. Bottom invertebrates from the *Nuphar luteum* clumps localities]. (DIZH).
- BIAŁYNICKA-BIRULA, A. 1993. *Badania porównawcze nad występowaniem mięczaków (*Mollusca*) w zbiornikach terasy zalewowej rzeki Grabii na odcinku Zimne Wody (lata 1962–1991)*. [Molluscs of Grabia River flood-land reservoirs in years 1962–1991 – a comparative study]. (DIZH).
- BIEGAJŁO, M. 1992. *Zmiany sezonowe fauny dennej wybranych odcinków rzeki Grabii*. [Seasonal changes of bottom fauna in chosen sections of Grabia River]. (DEZEB).
- BOMANOWSKI, S. 1959. *Występowanie ośliczki i kielża w rzece Grabii i zbiornikach jej terenu zalewowego*. [Distribution of freshwater hog louse and freshwater shrimp in Grabia River and its flood-land reservoirs]. (DIZH).
- BOMENOWSKA, B. 1959. *Małże rzeki Grabii*. [Bivalves of Grabia River]. (DIZH).
- BOTAS, T. 1990. *Struktura zespołów narybkowych w różnych środowiskach rzeki nizinnej*. [Structure of fry assemblages in different habitats of lowland rivers]. (DEVZ).
- CHMIELEWSKA, A. 1992. *Jętki (*Ephemeroptera*) środkowego odcinka rzeki Grabii*. [Mayflies (*Ephemeroptera*) of the middle course of Grabia River]. (DIZH).
- CINKOWSKA, E. 1977. *Wpływ temperatury na aktywność życiową larw *Hydropsyche angustipennis* (Curt.), *Limnephilus rhombicus* (L.) i *Limnephilus centralis* Curt. (*Trichoptera*)*. [Temperature effect on the life activity of *Hydropsyche angustipennis* (Curt.), *Limnephilus rhombicus* (L.) i *Limnephilus centralis* Curt. larvae (*Trichoptera*)]. (DEZEB).
- CYPROWSKI, M. 1997. *Makrofauna wybranego meandru rzeki Grabii, ze szczególnym uwzględnieniem skąposzczetów (*Oligochaeta*): skład gatunkowy, liczebność i zasięg pionowy w osadach dennych*. [Macrofauna, oligochaetes particularly, in chosen winding of Grabia River: species composition, abundance and vertical distribution in sediment profile]. (DIZH).

- CZEKALSKA, U. 1960. *Makrofauna rzeki Grabi i zbiornika jej terasy zalewowej w Łdzaniu ze szczególnym uwzględnieniem chrząszczy wodnych*. [Macrofauna, water beetles particularly, of Grabia River and its flood-land reservoirs]. (DIZH).
- DOMAŃSKI, J. 1966. *Morfologia i biologia kozy pospolitej *Cobitis taenia* (L.) z rzeki Grabi*. [Morphology and biology of spined loach (*Cobitis taenia* (L.)) in Grabia River]. (DIZH).
- DRZEWIECKA, W. D. 1960. *Makrofauna rzeki Grabi (stanowisko VIII) w Łdzaniu*. [Macrofauna of Grabia River in Łdzań]. (DIZH).
- DYLEWICZ, M. 1992. *Badania porównawcze nad występowaniem mięczaków (*Mollusca*) w rzece Grabi w latach 1962-65 i 1991 (odcinek Zimne Wody)* [Molluscs of Grabia River (Zimne Wody section) in years 1962-65 and 1991 - a comparative study]. (DIZH).
- DZIUBIŃSKA, I. 1980. *Wpływ temperatury na aktywność lokomotoryczną wodopójek (*Acari, Hydrarachnellae*)*. [Temperature effect on the motorial activity of water mites (*Acari, Hydrarachnelle*)]. (DEZEB)
- ECKERSDORF, M. 1992. *Porównanie wartości troficznej materii organicznej w dwóch typach rzek - wyżynnej i nizinnej. (Lubrzanka, Grabia)* [Comparison of the organic matter trophic value in two, upland Lubrzanka and lowland Grabia Rivers]. (DAE).
- EISBRENNER, E. 1994. *Letnia larwalna diapauza u *Anabolia furcata* Brauer (*Chruściki: Trichoptera*)*. [Summer diapause at *Anabolia furcata* Brauer (Caddis flies: *Trichoptera*)]. (DEZEB).
- ENGLER, H. 1977. *Wpływ różnych temperatur na rytm pracy serca larw wybranych gatunków chruścików (*Trichoptera*)*. [Temperature effect on the larvae heart activity of some caddies species (*Trichoptera*)]. (DEZEB).
- FIBIGER, K. 1989. *Dryf, migracja i zasiedlanie dna przez makrofaunę w lotycznym odcinku Grabi*. [Drift, migration and the bottom colonization by macrofauna in the lotic section of Grabia River]. (DIZH).
- FILIPCZAK, I. 1960. *Makrofauna rzeki Grabi w Łdzaniu ze szczególnym uwzględnieniem małżów*. [Macrofauna, particularly bivalves, of Grabia River in Łdzań]. (DIZH).
- FOKSOWICZ, M. 2001. *Struktura i dynamika ugrupowań bentofauny rzeki Grabi i Pilicy na tle czynników abiotycznych i biotycznych*. [Structure and dynamic of benthic assemblages in Grabia and Pilica Rivers on the background of biotic and abiotic factors]. (DAE).
- GOŁĘBIEWSKA, M. 1960. *Makrofauna rzeki Grabi i zbiornika terenu zalewowego (pow. Łask) ze szczególnym uwzględnieniem jętek*. [Macrofauna, mayflies larvae in particular, of Grabia River and its flood-land reservoirs]. (DIZH).
- GRZELACHOWSKA, R. 1991. *Dekompozycja materii organicznej w dwu typach rzek: wyżynnej i nizinnej (Lubrzanka, Grabia)*. [Decomposition of organic matter in upland Lubrzanka and lowland Grabia Rivers]. (DAE).
- IŻYKOWSKI, W. 1958. *Pluskwiaki wodne (*Heteroptera*) rzeki Grabi*. [Water bugs (*Heteroptera*) of Grabia River]. (DIZH).
- JABŁOŃSKA, J. 1988. *Realizacja instynktu budowlanego wybranych larw chruścików (*Trichoptera*)*. [Expression of building behaviour of some caddis larvae (*Trichoptera*)]. (DEZEB).
- JACHIMCZAK, K. 1992. *Fauna wioślarek (*Cladocera*) zbiorników terasy zalewowej rzeki Grabi na odcinku Zimne Wody*. [Water fleas (*Cladocera*) fauna of flood-land reservoirs of Grabia River in Zimne Wody]. (DIZH).
- JAKUBOWSKA, M. 1991. *Wartości progowe fotorecepcji ryb gatunku *Anoptichthys jordani* Hubbs et Innes 1936*. [Liminal values of photoreception at fish *Anoptichthys jordani* Hubbs et Innes 1936]. (KZDiBD).
- JAKUCEWICZ, H. 1966. *Morfologia i ekologia śliza *Nemecchilus barbatus* (Linne) rzeki Grabi*. [Morphology and ecology of loach *Nemecchilus barbatus* (Linne) from Grabia River]. (DIZH).
- JANION, S. 1952. *Badania nad morfologią pająków: topika (*Argyroneta aquatica*) i pająka domowego (*Tegenaria domestica*) w związku z ich sposobem życia*. [Morphology of *Argyroneta aquatica* and *Tegenaria domestica* on account with their life model]. (DIZH).

- JANKOWSKA, M. 1976. *Analiza instynktu budowlanego u larw chruścików (Molanna angustata Curt., Limnephilus flavicornis (Fabr.), Limnephilus borealis (Zett.)).* [Building behaviour of caddis larvae *Molanna angustata* Curt., *Limnephilus flavicornis* (Fabr.), *Limnephilus borealis* (Zett.)]. (DEZEB).
- KACALAK, I. 1992. *Zmiany sezonowe fauny dennej regulowanego i naturalnego fragmentu dorzecza Grabi.* [Seasonal changes of bottom fauna in both flood-controlled and natural section of Grabia River catchment area]. (DEZEB).
- KAMECKA, J. 1999. *Sezonowe zmiany struktury i funkcjonowania fauny dennej rzeki nizinnej na tle czynników abiotycznych i biotycznych.* [Seasonal changes of lowland river bottom fauna on the background of abiotic and biotic factors]. (DAB).
- KISZKURNO, D. 1960. *Makrofauna starorzecza rzeki Grabi w stanowisku V w Ldzaniu ze szczególnym uwzględnieniem pluskwiaków różnoskrzydłych.* [Macrofauna, water bugs in particular, of the Grabia River old river bed in Ldzan]. (DIZH).
- KLIMASZEWSKA, H. 1952. *Morfologia larw ważek rzeki Grabi w związku z ich warunkami życia.* [Morphology of dragonfly larvae in Grabia River on account with their life mode]. (DIZH).
- KOSMAŁA, E. 2002. *Chruściki (Trichoptera) wybranych zalewów łąkowych rzeki Grabi.* [Caddis flies (Trichoptera) in chosen regions of Grabia River flood-land]. (DEZEB).
- KOSIOREK, B. 1952. *Badania nad zmiennością wrotków z rodzaju Keratella Bory de St. Vincent ze zbiorników terenu zalewowego Grabi.* [Variability of *Keratella* Bory de St. Vincent (Rotatoria) from Grabia River flood-land reservoirs]. (DIZH).
- KOWALEWSKA, B. 1994. *Letnia larwalna diapauza u Halesus tessellatus (Trichoptera: Limnephilidae).* [Summer diapause at the *Halesus tessellatus* (Trichoptera: Limnephilidae) larvae]. (DEZEB).
- KOZŁOWSKA, A. 1979. *Wpływ temperatury na pulsację naczyń grzbietowych larw wybranych gatunków chruścików (Trichoptera, Insecta).* [Temperature effect on the dorsal vessel pulsation at some species of caddis larvae (Trichoptera, Insecta)]. (DEZEB).
- KOZŁOWSKA, M. 1994. *Powiązania makrofauny (Invertebrata) z wybranymi gatunkami makrofitów w środowisku rzeczonym (rzeka Grabia).* [Relationships of macroinvertebrates and some species of macrophytes in the environment of Grabia River]. (DIZH).
- KUBICKA, J. 1956. *Cerkarie znalezione w ślimakach ze zbiorników okresowo połączonych z rzeką Grabią.* [Cercariae from snails found in temporary reservoirs connected with Grabia River]. (DIZH).
- KULAK, J. 1968. *Budowa układu rozrodczego pijawki Batracobdella paludosa (Carena).* [Anatomy of reproductive organs of leech *Batracobdella paludosa* (Carena)]. (DIZH).
- KURASIK, G. 1985. *Wpływ światła na aktywność lokomotoryczną wodopójek (Acari, Hydrachnellae).* [Light effect on the motorial activity of water mites (Acari, Hydrachnellae)]. (DEZEB).
- KWIECIEŃ, M. 1988. *Badania dryfu, migracji i zasiedlania dna przez makrofaunę w wybranym odcinku rzeki Grabi.* [Drift, migration and the bottom colonization by macrofauna in the chosen section of Grabia River]. (DIZH).
- LATEK, K. 2002. *Wpływ środowiska na biologię i zachowanie budowlane larw Anabolia furcata Brauer (Trichoptera).* [Environmental influences on the biology and building behaviour of caddis larvae *Anabolia furcata* Brauer (Trichoptera)]. (DEZEB).
- ŁACHETA, A. 1999. *Muchówki z rodzin Limoniidae i Pediciidae (Diptera, Nematocera) doliny rzeki Grabi.* [Crane flies (Limoniidae and Pediciidae, Diptera) of Grabia River valley]. (DIZH).
- ŁĘCKA, G. 1959. *Ważki (Odonata) rzeki Grabi.* [Dragonflies (Odonata) of Grabia River]. (DIZH).
- ŁAGIEWKA, M. 1999. *Plastyczność instynktu budowlanego u larw Trichoptera.* [Building behaviour plasticity at caddis larvae (Trichoptera)]. (DEZEB).
- MAJKUSIAK, H. 1952. *Morfologia ośliczki i warunki jej życia w rzece Grabi.* [Life conditions and morphology of water slater in Grabia River]. (DIZH).
- MIANOWANA, K. 1962. *Mięczaki rzeki Grabi między Baryczą i Kolumną.* [Molluscs of Grabia River between Barycz and Kolumna]. (DIZH).

- WEDER, M. 1962. *Zabarwice i okudlice niektórych rzek województwa łódzkiego*. [Alderflies and lacewing larvae of some rivers in voivodshaf of Łódź]. (DIZH).
- WENDLER, J. 1968. *Budowa układu pokarmowego pijawki *Batracobdella paludosa* (Carena)*. [Anatomy of digestive system of leech *Batracobdella paludosa* (Carena)]. (DIZH).
- WIELECHOWICZ, J. 1997. *Mięczaki (Mollusca) i towarzysząca im makrofauna (Macroinvertebrata) wybranych odcinków górnego biegu Grabi (stanowisko: Mzurki)*. [Molluscs and associated macroinvertebrates in chosen sections of the upper course of Grabia River (Mzurki locality)]. (DIZH).
- WIŚNIEWSKA, A. 2002. *Charakterystyka fauny dennej rolniczo użytkowanej zlewni nizinnej rzeki na tle długoterminowych zmian chemizmu wód*. [Bottom fauna of lowland river on the background of longterm changes of water chemical properties]. (DAE).
- WITCZAK, J. 1988. *Produkcja dominujących gatunków Chironomidae w wybranym odcinku dolnego biegu rzeki Grabi*. [Production of dominant chironomid species in chosen section of the lower course of Grabia River]. (DEVZ).
- WŁODARCZYK, E. 1995. *Fauna jętek wybranego odcinka środkowego biegu Grabi*. [Mayflies fauna of the chosen section of the middle course of Grabia River]. (DIZH).
- WIEWIÓRKOWSKA, B. 1957. *Narządy pyszczkowe larw ważek (Odonata)*. [Mouth parts of dragonflies (Odonata) larvae]. (DIZH).
- WOŁOSZYŃSKA, J. 1968. *Populacje kielży z rodzaju *Gammarus* w niektórych dopływach Grabi*. [*Gammarus* populations in some tributaries of Grabia River]. (DIZH).
- WRÓBLEWSKA, K. 1998. *Struktura ugrupowań bentofauny rzeki Grabi na tle czynników abiotycznych i biotycznych*. [Structure of zoobenthos assemblages of Grabia River on the background of biotic and abiotic factors]. (DAE).
- ZARZYCKI, J. 1983. *Próba oceny zanieczyszczeń rzeki Grabi metodą indeksów biotycznych*. [An attempt of Grabia River pollution estimation by biotic indices method]. (DIZH).
- ZAWADZKA, M. 1952. *Morfologia kielża *Gammarus pulex* i warunki jego życia w rzece Grabi*. [Morphology of freshwater shrimp (*Gammarus pulex*) and its life conditions in Grabia River]. (DIZH).
- ŻBIKOWSKI, J. 1956. *Wrotki – komensale skorupiaków *Asellus aquaticus* (L.) i *Gammarus pulex* (L.) okolic Łodzi*. [Rotifers – commensals of water slater (*Asellus aquaticus* (L.)) and freshwater shrimp (*Gammarus pulex* (L.)) in the Łódź region]. (DIZH).
- ŻEBROWSKI, J. 1997. *Wpływ regulacji małej rzeki nizinnej na zgrupowania makrobezkręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem mięczaków*. [River training effect of a small lowland river on macroinvertebrates with special regard to molluscs]. (DIZH).
- ŻELAZNY, W. 1966. *Kiełb krótkowąsy w rzece Grabi*. [Gudgeon (*Gobio gobio*) in Grabia River]. (DIZH).
- ŻÓLTOWSKA, E. 1991. *Przejawy adaptacji oddechowych przedstawicieli rodzaju *Potamophylax* (Wall.)*. [Aspects of respiratory adaptations of some *Potamophylax* (Wall.) species]. (DEZEB).

Doctor's theses (PhD theses):

- FRANKIEWICZ, P. 1989. *Wykorzystywanie zasobów troficznych rzek przez ryby autochtoniczne i introdukowane pstrągi w różnych strefach gospodarczych*. [The use of trophic resources of rivers by autochthonous fish and introduced trouts in different geographic zones]. University of Łódź.
- JAŹDZEWSKA, T. 1968. *Jętki (Ephemeroptera) rzeki Grabi*. [Mayflies (Ephemeroptera) of Grabia River]. University of Łódź.
- KRAJEWSKI, S. 1967. *Pluskwiaki wodne (Heteroptera) rzeki Grabi i jej terenu zalewowego*. [Water bugs (Heteroptera) of Grabia River and its flood-land]. University of Łódź.

- KRAUZE, K. 2002. *Długoterminowe zmiany w strukturze dolin rzek i ich konsekwencje dla struktury i dynamiki zespołów ryb*. [Longterm changes in the river's valleys and their effects on the structure and dynamic of fish communities]. University of Łódź.
- ŁAPIŃSKA, M. 1996. *Przestrzeń jako czynnik limitujący zespoły ryb w rzece nizinnej i wyżynnej*. [Space as the limiting factor for fish communities in lowland and upland river systems]. University of Łódź.
- NIESIOŁOWSKI, S. 1978. *Meszki (Simuliidae, Diptera) rzeki Widawki i Grabii*. [Blackflies (Simuliidae, Diptera) of Widawka and Grabia Rivers]. University of Łódź.
- PAWŁOWSKI, L. K. 1932. *Studia nad anatomią i ekologią wrotka Drilophaga delagei de Beauchamp, pasożyta zewnętrznego pijawek*. [Anatomy and ecology of rotifer *Drilophaga delagei* de Beauchamp, an ectoparasite of leeches]. Warsaw University.
- PIECHOCKI, A. 1968. *Mięczaki (Mollusca) rzeki Grabii i jej terenu zalewowego*. [Molluscs of River Grabia and its flood-land]. University of Łódź.
- SANDNER, H. 1950. *Badania nad fauną pijawek*. [Leeches fauna research]. University of Łódź.
- SEKULSKA-NALEWAJKO, J. 2001. *Gatunkowa i ekologiczna różnorodność zbiorowisk okrzemek oraz biomasa glonów w poszczególnych siedliskach w rzece Grabii*. [Species and ecological diversity of diatoms assemblages and algae biomass in different habitats of Grabia River]. University of Łódź.
- TABACKI, A. 1969. *Widłonogi (Copepoda) rzeki Grabii*. [Copepoda of Grabia River]. University of Łódź.
- TOŃCZYK, G. 2001. *Ważki (Odonata) rzeki Grabii – występowanie, biologia i ekologia*. [Dragonflies (Odonata) of Grabia River – distribution, biology and ecology]. University of Łódź.
- WIEDEŃSKA, J. 1983. *Muchówki z rodziny sygaczowatych (Limoniidae, Diptera) dolin rzek Lubrzanki i Grabii*. [Crane flies (Limoniidae) of valleys of Lubrzanka and Grabia Rivers]. University of Łódź.
- WOJTAS, F. 1960. *Pijawki (Hirudinea) rzeki Grabii*. [Leeches (Hirudinea) of Grabia River]. University of Łódź.

Assistant-professor thesis:

- GRZYBKOWSKA, M. 1993. *Chironomidae w bentosie i dryfie odcinków rzek o różnej rzędowości w Polsce Środkowej*. [Chironomidae in benthos and drift in lowland rivers in central Poland]. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 120 pp.